

Paghahanda ng binhi

A. Ibabad ang binhi ng 18-24 oras

TANDAAN: Ang mga binhing lumutang ay tutubo pa rin.

B. Ikulob ang binhi ng 24-36 oras

Maglipat-tanim makalipas ang 18-21 na araw pagkatapos magpunla

Rekomendadong distansya sa pagtatanim:

Tag-ulan na panahon : 20 cm x 20 cm

Tag-init na panahon: 15 cm x 20 cm

Sundin ang tamang paraan ng pagpapatubig

Sa pagsugpo ng peste at sakit, sundin ang Leads Agri Rice Management Solutions Package of Technology

Maaani na ang LAV 777 Hybrid Rice 100-112 na araw mula sa pagpupunla, o kapag ang mga butil ay 90-95% golden yellow na ang kulay.

LEADS AGRIVENTURES

LAV 777

HYBRID RICE SEEDS

Rekomendasyon ng Abono sa PUNLAAN na may sukat na 400m²-500m² (para sa 1ha)

Timing ng Pag-abono	Uri ng Abono	Dami
Basal	14-14-14 (Complete)	15kg
7 araw matapos ipunla	46-0-0 (Urea)	3kg
14 araw matapos ipunla	46-0-0 (Urea)	3kg

Rekomendasyon ng Abono sa PALAYAN

Timing ng Pag-abono	Uri ng Abono	Tag-araw (150-35-65 NPK)	Tag-ulan (81-35-65 NPK)
4 - 6 araw matapos maglipat-tanim	14-14-14 (Complete) 46-0-0 (Urea)	3 sako 2 sako	3 sako 1 sako
14 - 16 araw matapos maglipat-tanim	14-14-14 (Complete) 46-0-0 (Urea)	2 sako 2 sako	2 sako 0.5 sako
35 - 40 araw matapos maglipat-tanim	46-0-0 (Urea) 0-0-60 (Muriate of Potash)		0.5 sako 1 sako
40 - 45 araw matapos maglipat-tanim	46-0-0 (Urea) 0-0-60 (Muriate of Potash)	1 sako 1 sako	
	Kabuuang Dami	11 sako	8 sako

